

Craignez-vous les épisodes d'hypoglycémie sévère?

BAQSIMI[®] est un médicament utilisé pour traiter une forte baisse du taux de sucre dans le sang. On l'administre aux personnes qui sont incapables de manger, de boire ou d'avaler du sucre par elles-mêmes en cas d'urgence liée à une baisse du taux de sucre dans le sang (hypoglycémie sévère). BAQSIMI est destiné aux adultes et aux enfants de 4 ans et plus qui prennent de l'insuline contre le diabète.

Les essentiels de BAQSIMI

- **Gardez le tube scellé jusqu'au moment de l'emploi. L'exposition à l'humidité pourrait nuire à l'efficacité attendue de BAQSIMI**
- Chaque dispositif BAQSIMI contient une dose (3 mg) de glucagon sous forme de poudre pour administration nasale et ne peut être utilisé qu'une seule fois
- BAQSIMI doit être administré uniquement par voie nasale
- BAQSIMI ne doit pas être utilisé après la date de péremption
- N'oubliez pas de dire à vos proches ou à votre enfant où vous avez rangé BAQSIMI
- **BAQSIMI peut être utilisé même si vous avez un rhume ou si vous prenez des médicaments contre le rhume.**
- BAQSIMI n'a pas besoin d'être conservé au réfrigérateur. Il peut être conservé à des températures allant jusqu'à 30 °C (86 °F).

Ayez toujours un dispositif BAQSIMI sur vous et conservez-en un dans les endroits où vous passez le plus de temps : à la maison, au travail, à l'école.

Comment utiliser BAQSIMI?

Montrez à votre famille, à vos amis et à vos collègues l'endroit où vous conservez BAQSIMI et expliquez-leur comment utiliser le produit à l'aide des présentes directives.

Ils doivent savoir comment utiliser ce produit avant que vous en ayez besoin.

IMPORTANT

- **Ne pas retirer la pellicule de plastique ni ouvrir le tube avant d'être prêt à administrer la dose.**
- **Ne testez pas le dispositif avant de l'utiliser**, car il ne contient qu'une seule dose de glucagon et ne peut pas être réutilisé.
- BAQSIMI doit être administré par le nez seulement.
- Veuillez lire les Renseignements destinés aux patients au sujet de BAQSIMI avant de l'utiliser



Administration de la dose



Tenez le dispositif entre les doigts et le pouce

N'appuyez pas sur le piston avant d'avoir inséré la tige dans une narine



1 **Insérez doucement la tige** dans l'une des narines jusqu'à ce que les doigts touchent l'extérieur du nez



2 **Enfoncez complètement le piston.**

La dose complète est administrée lorsque la **ligne verte** n'est plus visible.